

## Sortie de Ligueux le 12 novembre 2017

Traditionnellement organisée en fin de saison par Stéphanie Guilhot, la sortie de Ligueux est l'occasion de prospecter en Périgord Blanc. Elle se déroule sur des terrains où alternent dépôts détritiques du tertiaire et calcaires du crétacé, et présente une grande diversité fongique. Cette année encore la collecte fut riche de 144 espèces récoltées par une vingtaine de participants.

Parmi cette liste il y avait deux petits marasmes forts communs, mais très ressemblants et qu'il est pourtant facile de distinguer. Ce sont le Marasme petite roue (*Marasmius rotula*) et le Marasme de Bulliard (*Marasmius bulliardii*). Ils possèdent tous les deux un chapeau fortement strié-cannelé en forme de parachute, des lames très espacées insérées sur un collarium et un pied en forme de crin, brun-noir.

Lames espacées insérées sur un collarium :

(= membrane réunissant les lames à proximité du pied et ménageant un petit espace circulaire)



Les différences portent sur le chapeau et l'habitat :



*Marasmius rotula* : Chapeau blanc à centre grisâtre à ochracé – Sur bois



*Marasmius bulliardii* : Chapeau un peu plus brun avec une papille noire au centre – Sur feuilles

Signalons enfin une curiosité, il s'agit d'*Anthina flammea*. C'est un petit champignon (1 à 3 cm) énigmatique constitué uniquement de filaments mycéliens, et pour lequel on ne connaît pas de forme de reproduction sexuée ou asexuée. Malgré cela il est classé parmi les Ascomycètes. Comme son nom l'indique il se présente sous la forme d'une flamme rouge corail à extrémité blanchâtre. Il affectionne les feuilles de hêtre, bien qu'ici il soit greffé sur feuille de chêne.



Contactez le rédacteur : [alain.coustillas@wanadoo.fr](mailto:alain.coustillas@wanadoo.fr)