

## Tableaux d'identification des principaux lactaires de Dordogne

Présence en Dordogne : C : commun ; PC : peu commun ; R : rare

Lait blanc ou aqueux, nechangeant pas de couleur à l'air (attendre au moins 5-10 min !)					Frq.	
Chapeau ± blanc ou blanchâtre	Chapeau ± velouté, lames espacées	Lait fortement brunissant à l'air (voir plus bas)		<b>L. luteolus</b>	R	
		Lait doux, KOH = 0		<b>L. vellereus</b>	C	66
		Lait très acre, KOH = jaune		<b>L. bertillonii</b>	R	1
	Chapeau non velouté, lames serrées	Chapeau et lames rosâtres		<b>L. controversus</b>	C	59
		Lait blanc en séchant, KOH et formol = 0		<b>L. piperatus</b>	C	5
		Lait verdâtre en séchant (sous hêtre à chapeau visqueux, pensez à <i>L. pallidus</i> et à <i>L. blennius</i> f. <i>albidopallens</i> )	KOH jaune = jaune vif Formol = très lentement bleu	<b>L. glaucescens</b>	PC	1
KOH jaune = jaune vif Formol = bleu vif rapide	<b>L. pergamenus</b>		PC	0		
Chapeau coloré et zoné	Chapeau poilu-barbu au bord (loupe !)	Chapeau >12 cm, rose à rougeâtre		<b>L. torminosus</b>	PC	11
		Chapeau >10 cm, crème rosâtre		<b>L. pubescens</b>	PC	10
	Chapeau crème, jaune roussâtre à orangé roussâtre ; espèces plutôt estivales	Chapeau crème, souvent peu nettement zoné, lames serrées ; bonne odeur de pomme		<b>L. evosmus</b>	C	7
		Chapeau jaune roussâtre, lames espacées, teintées de rosâtre et crispées autour du pied ; odeur fruitée		<b>L. acerrimus</b>	PC	32
		Chapeau crème à jaune roussâtre, nettement zoné au moins au bord, lames moyennement serrées ; odeur résineuse		<b>L. zonarius</b>	PC	34
	Chapeau brun terne rosâtre à brun rougeâtre ; odeur douceâtre, dite « de punaise » ; pied plus sombre en bas ; chênes		<b>L. quietus</b>	C	130	
	Chapeau gris, gris-rose ou gris-lilas ; odeur faible	Chapeau gris, lames plutôt serrées, pâles ; uniquement sous les charmes (attention à <i>L. pyrogalus</i> , à lames espacées colorées, sous noisetier)		<b>L. circellatus</b>	C	16
		Chapeau gris, gris-rose ou gris lilas ; sous feuillus et conifères (lames plus espacées que <i>circellatus</i> )		<b>L. flexuosus</b>	R	1
	Chapeau chamois ochracé à brun-rose ou brun rougeâtre ; odeur aromatique		<b>L. hyginus</b>	R	0	
	Chapeau coloré non zoné	Chapeau nettement feutré	Chapeau mamelonné, brun-roux ; surtout sous épicéas et pins		<b>L. rufus</b>	R
Chapeau rose-vineux à lilas ; sous aulnes			<b>L. lilacinus</b>	R	0	
Chapeau glabre et lisse		Chapeau ± zoné ; odeur douceâtre « de punaise » ; pied plus sombre en bas ; chênes		<b>L. quietus</b>	C	130
		Chapeau gris-beige lilacin ; forte odeur de noix de coco ; bouleaux		<b>L. glyciosmus</b>	PC	1
		Chapeau crème ochracé très pâle ; inodore ; hêtres		<b>L. pallidus</b>	PC	2
		Chapeau ocre rosâtre à beige rosâtre ; odeur de <i>Pelargonium</i>		<b>L. decipiens</b>	PC	8
		Chapeau beige chamois à brunâtre, mat ; odeur de caoutchouc (aspect « objet en caoutchouc ») ; hêtres		<b>L. subdulcis</b>	PC	5
		Chapeau orange vif ou brun-rouge	Chapeau brun-rouge ; odeur de chicorée		<b>L. camphoratus</b>	C
Chapeau orange vif ; odeur de caoutchouc			<b>L. fulvissimus</b>	PC	5	
Chapeau glabre et nettement ridé		Chapeau brun bai à brun rougeâtre		<b>L. serifluus</b>	PC	11
	Chapeau brun sombre à brun noirâtre		<b>L. subumbonatus</b>	PC	29	

Lait blanc ou blanchâtre (parfois aqueux) jaunissant au moins sur un mouchoir (5-10 min)						
Chapeau poilu-barbu au bord (loupe!)		Chapeau nettement poilu-barbu ; feuillus	<b>L. citriolens</b>	R	0	
		Chapeau peu poilu-barbu ; épicéas	<b>L. scrobiculatus</b>	R	1	
Chapeau nettement zoné, >9 cm, chamois orangé à ochracé saumoné ; lait jaunissant rapidement à l'air			<b>L. chrysorrhoeus</b>	C	119	
Chapeau non ou peu zoné	Chapeau avec des teintes orangées évidentes	Chapeau orangé vif, souvent plus pâle au bord ; odeur de caoutchouc	<b>L. britannicus f. pseudofulvissimus</b>	C	8	
		Chapeau orangé terne à orangé brunâtre ; odeur faible ; lames en filets en haut du pied <b>bas brun rouge</b> ; lieux humides ( <b>jauniss. mouchoir=peu lent</b> )	<b>L. lacunarum</b>	PC	26	
		Chapeau plutôt pâle, souvent ridé autour d'un petit mamelon	<b>L. tabidus</b>	C	11	
	Chapeau sans teinte orangées (ou très peu nettes)	<b>Chapeau ocre rosâtre à beige rosâtre ; odeur de Pelargonium (jauniss. mouchoir=immédiat)</b>		<b>L. decipiens</b>	PC	8
		Chapeau brun-rouge à brun pourpré ; odeur de caoutchouc ; sous feuillus		<b>L. britannicus</b>	R	3
		Chapeau brun châtain sombre à brun rougeâtre «couleur de foie» ; sous conifères (surtout pins)		<b>L. hepaticus</b>	C	0

Lait blanc, verdissant en séchant (5-10 min)					
Chapeau brun olivâtre à brun noirâtre, plus jaune olive au bord ; tout le champignon devient rouge sombre violacé avec KOH			<b>L. necator</b>	PC	12
Chapeau à teintes verdâtres ou olivâtres	Chapeau nettement visqueux, lames blanches ; sous les hêtres		<b>L. blennius var. viridis</b>	PC	9
	Chapeau non visqueux (variable de couleur !), lames crème ochracé ; sous les noisetiers		<b>L. pyrogalus</b>	C	18
Chapeau sans teintes verdâtres	Chapeau nettement visqueux, lames blanches ; sous les hêtres		<b>L. blennius</b>	R	8
	Chapeau non visqueux (variable de couleur !), lames crème ochracé ; sous les noisetiers		<b>L. pyrogalus</b>	C	18

Lait blanc, devenant violacé en séchant (5-10 min)					
Chapeau à teintes jaunes	Chapeau poilu-barbu au bord		<b>L. repraesantaneus</b>	R	0
	Chapeau glabre		<b>L. flavidus</b>	C	7
Chapeau sans teintes jaunes	Chapeau nettement visqueux, en général non zoné		<b>L. uvidus</b>	C	84
	Chapeau peu visqueux ou vite sec, en général ± nettement zoné	Chapeau terne ± zoné de fossettes concentriques	<b>L. luridus</b>	PC	19
		Chapeau sombre nettement zoné de cernes sombres	<b>L. violascens</b>	R	7

Lait blanc se colorant en brun à l'air (5-10 min)					
Chapeau blanchâtre finement velouté ; petite espèce rare			<b>L. luteolus</b>	R	0
Chapeau orangé, lisse vite craquelé, odeur forte de fond d'artichaut, Fer vert			<b>L. volemus</b>	PC	13
Chapeau orangé, ridé, odeur faible de fond d'artichaut, Fer nul			<b>L. rugatus</b>	R	0

<b>Lait blanc, devenant rose en séchant (5-10 min)</b>					•	
Chapeau visqueux, pâle ; lait devenant vite « rose dentifrice »			<b>L. acris</b>	PC	3	
<b>Chapeau sec</b>	Chapeau <b>nettement</b> ocre ou ochracé, en général nettement ridé ; lames plutôt serrées		<b>L. pterosporus</b>	C	15	
	Chapeau brun ± sombre, non ridé ou seulement un peu au centre	Chapeau gris-brun café-au-lait	Chapeau ± décoloré par endroits ; pied blanc	<b>L. azonites</b>	C	20
			Chapeau de couleur plus uniforme ; pied brun grisâtre	<b>L. fuliginosus</b>	PC	30
		Chapeau brun très sombre à brun fuligineux noirâtre	Chapeau crénelé au bord ; chair amarescente	<b>L. ruginosus</b>	R	0
			Chapeau non crénelé au bord ; chair un peu piquante	<b>L. romagnesii</b>	R	1

<b>Lait orange ou rouge ± vineux</b>					
<b>Sous les pins</b>	Lait d'emblée orange vif à la coupe	Chapeau > 15 cm, verdissant tardivement ; pied à fossettes ; lait ne changeant pas de couleur (la var. rubescens a le lait qui rougit en plus de 30 min)	<b>L. deliciosus</b>	C	92
		Chapeau > 10 cm (souvent plus petit !), verdissant vite ; pied avec peu ou pas de fossettes ; lait rouge-vineux en 5-8 min	<b>L. semisanguifluus</b>	PC	38
		Chapeau > 10 cm (souvent plus petit !), de couleur terne (évoque <i>L. quietus</i> !); pied avec peu ou pas de fossettes ; lait rouge-vineux en env. 20 min	<b>L. quieticolor</b>	PC	41
	Lait d'emblée rouge-vineux à la coupe	<b>L. sanguifluus</b>	PC	14	
<b>Sous les épicéas</b>			<b>L. deterrimus</b>	C	17
<b>Sous les sapins</b>			<b>L. salmonicolor</b>	R	0